

ANTI-HISTAMINICO  
EXPECTORANTE - ANTI-ASMÁTICO



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

PRIMERA  
DISIPULOS

DE EFECTO SORPRENDENTE

# HISTIDRÓMACO

ADULTOS E INFANTIL

FUMARATO DE METAPIRILENO  
CLORHIDRATO DE EFEDRINA - CODEINA  
CLORURO DE AMONIO - JARABE DE TOLU



LABORATORIOS ANDROMACO

Avda. Ing. Huerga 1139-31 Buenos Aires

ACION

# HISTIDRÓMACO

ADULTOS E INFANTIL

Antihistamínico - Expectorante  
Antiasmático

## HISTIDRÓMACO ADULTOS:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Fumarato de metapirileno .....               | 0,167 g.                |
| Clorhidrato de efedrina .....                | 0,100 »                 |
| Codeína .....                                | 0,100 »                 |
| Cloruro de amonio .....                      | 3,000 »                 |
| Jarabe de Tolú .....                         | 20,000 cm <sup>3</sup>  |
| Benzoato de sodio .....                      | 0,500 »                 |
| Vehículo hidroalcohólico aromát., c. s. p. . | 100,000 cm <sup>3</sup> |

## HISTIDRÓMACO INFANTIL:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Fumarato de metapirileno .....               | 0,100 g.                |
| Clorhidrato de efedrina .....                | 0,050 »                 |
| Cloruro de amonio .....                      | 2,000 »                 |
| Jarabe de Tolú .....                         | 20,000 cm <sup>3</sup>  |
| Benzoato de sodio .....                      | 0,500 »                 |
| Vehículo hidroalcohólico aromát., c. s. p. . | 100,000 cm <sup>3</sup> |

## INDICACIONES:

Bronquitis agudas o crónicas. Bronquitis alérgicas y asmáticas. Rinitis, laringo-traqueítis gripales.

## DOSIS:

**HISTIDRÓMACO ADULTOS:** 1 cucharada de postre (10 cm<sup>3</sup>) cada 4 horas, pudiendo ser aumentada la dosis a criterio médico a una cucharada sopera (15 cm<sup>3</sup>) cada 4 horas.



IMPRESOS DIFERIDOS



SR. DR. 1-2-37 M-  
R. J. FLORES BELAUNDE  
PARAGUAY 987 3'  
BS. AS.

**HISTIDRÓMACO INFANTIL:** Niños menores de 1 año: según prescripción facultativa. De 1 a 3 años: 1 cucharada de las de café (5 cm<sup>3</sup>) hasta 4 veces al día. De 3 a 6 años: 1 cucharada de las de café (5 cm<sup>3</sup>) cada 4 horas. Mayores de 6 años: 1 a 2 cucharadas de las de café, cada 4 horas. (Salvo indicación facultativa).

## PRESENTACION:

Fascos de 150 cm<sup>3</sup>.

F. 08-234

UNI-0083756 P. 348-349 1194