

Tranquilidad durante todo el día con 1 mg. de...



... **Randolectil**®
(Butirilperacina)





Randolectil[®]

Indicaciones

Tranquilizante

sin efecto hipnótico
ni efectos secundarios



UNAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Intranquilidad, Ansiedad

Angustia y tensión psíquica
de naturaleza funcional

Preocupación, Inquietud

Irritabilidad, Agresividad

Depresión, Hiperemotividad

Afectividad perturbada

Disfunción neurovegetativa

Eretismo cardiovascular

Neurastenia

Tensión premenstrual

Dismenorrea

Menopausia

Dosificación:

Un comprimido por la mañana, a repetir,
si fuera necesario, por la noche.

Presentación:

20 y 60 comprimidos de 1 mg.

Fabricado según fórmula original y bajo
licencia de BAYER Leverkusen (Alemania)
BAYER ARGENTINA S.A.
DIVISION FARMA
Empedrado 2425, Bv. Avda. Tel. 50-5171/75

Delegaciones

Independencia 857
Boulogne Sur Mer 1675,
San Martín 862, P. 6º, Of. 601,
Rivadavia 179, P. 6º, Local 19,

CORDOBA, Tel. 36051.
MENDOZA, Tel. 19938.
ROSARIO (Santa Fe), Tel. 68986.
TUCUMAN, Teléfono 26062.